Naslada

Vass7R13s316-320

dantanlantanlantanlantanl



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp779

XP733.346.32

7 R13 p.316,320

Naslada 7 R 13 a. 31 6.320

















ANNEE 1993

Luntumlandandandandandandan

NOM Naslada.

EMPLACEMENT 7 R134-316.320 . 3 Rrop 376-380

Bd. 52.89. W

-															
Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo début	raison mi/f	fin	Vé: début	raison mi/v	fin	Maturité			
1	4	18.3	223×	7	5	25.5	28,5	3-6	19,7	E5,7	2,8	6.9			
2 f	l,	18.3	22.3×				-2	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		+1		+4			
4	5	18.3	22.34	0	Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C Pour : Mill :										
5 f					Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus										
	D le 2	2. 3,93			Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb										
		+2/			Pépins : avec - apyrène Port : way Vigueur : 3										
						2	f								
P. S. Vienning															

ANNEE: 1994 NOM Naslada

EMPLACEMENT 7 R13 1316.320

	ni													
ouche	Nbre yeux	eux début mi/déb grap					mi/f	fin				Maturit		
1 2 }	2	3,3	7,3 *	4	17	26.5	28.5	31,5	25,7	28,3	1.8	22.8		
	4	2.3	7,3.	2	Grappe: G - M - P Dim: 14 Compacité: L - [
5 1	De	7.3.9	4(0)		Saveur	disc- disc- r : B	G-M sph-el Gr-Rs- m - a	Rg-N r - f	obov-c Jus ox h	yl-fus : ind erb		oloré		

ANNEE: 1995
NOM Naslada EMPLACEMENT. 7 R 13 4 316, 320 .
WORAI

doutonleatonleatonleatonl

ouche	Whre		rrement mi/déb		Ferti- lité	Floraison debut mi/f fin			Véraison début mi/v fin		Maturit €			
1 2	3	23,2	27,24	70	13	23,5	28.5	26	2417	1,8	7,8	43		
3	4	63	13.3"	17	Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - N-C									
4	3	23, 2	6.31	4	Pour : Mill :									
5	2	27,2	6,3	0	Baie: TC - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus									
	14 D le	6.3.	35 (-11)	18	disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: S-m lear - fox - herb Pépins: avec apyrène Fort: Vigueur: 3,5									

(
AMU	ANUEE: 1096														
HOL	MOM Naslada EMPLACEMENT 7 R13 A 316.320														
Bd 52.89															
iche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Ubre grap	Ferti- lité		raison mi/f			raison mi/v		Maturité			
	4	15.2	11.31	10	12	28.5	3.6	6.6	29.7	1.8	6.8	11, 9			
2	要	otes	11.3× 18.3× 22.3×		110		+4			+2		M.9			
3	4	11.3	18.3.	8	8 Grappe: G - M - P Dim: Compacité: L - M - C										
d	4	18.3	11,3 x	4	Pour :		Mil								
5	1				Baie:					-1 - fug					
		0 10	0 00		Couleu				obov-cy Jus		- CC	oloré			
	D	le 18.	3,96			: 5 -		•							
			(72)		1 manufactured? Introduction to the con-	: ave	с - ар								
		,			Fort :			V	igueur	:					
	-														

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement : Naslada 7 R13 0 316.320.4.1

dantadantadantadantad

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente 2/8 /- sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198,

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202)- duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280)- sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 2/10 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 2(12) - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 283.)

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 91

Naslada 7 R 130,316,320 4,1

dantanlantanlantanlantaal

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 - séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.)

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

-Calvo 92

Naslada

N° d'ordre :

Désignation :

7 R130. 316,380 A.3

duntanlınıtındınıtındınıtınd

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143,

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

<u>limbe</u>: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

· Calve 92

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

Naslada 7 R 130.316-3200.1

dantadantadantadantad

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 14 x). Lâche (1 - Moyenne (2) - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 8(1,

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions 20 x W). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée \$2) - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97) - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105) - coloré 106.

A ombilic très apparent - pen apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111,

A saveur neutre 1/2 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 1/20) - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 1/22 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent (29).

A pinceau : court 130 - moyen 1(31) - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136) - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse (39) - molle 140 - peu juteuse.

Avec pepins - apyrene.

Calvo 92

DENOMINATION :

Naslada 7R130-316-320 A.3

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3) : grêle (1) - moyen (2) - fort (3) : ramifié (1) - peu ramifié (2) : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2) Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) - cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - effacé(2)

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 94

```
H° d'ordre :
Désignation: Naslada
Emplacement: 7 R 13 A 316 - 320
                                    : (1)-2-3
Angle des nervures
                                    : 4 - 5 - 6
Sexe
                                    : (7) - 8 - 9
Lil/L
                                    : (10) - (11)
L2/L
                                    : (12) - (13) - 14 - 15 - 16
Nombre de lobes
                                   : (17 - (18 - (19 - 20
Prof. sinus latéral Sup.
                                    : (21) - 22 - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                                    : (25) - (26) - 27 - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V
                                    : 266
                                    : (267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                                    : (31) - (32) - 33 - (34) - 35 - 36 - 37 - 38 - (39)
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                   : (271)
                                    : (40) - (41)
Dents : forme
                                    : 42 - 43 - 44
Dents (angle)
                                    : 45 - (46) - 47
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
                                  : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
 Nbre dents du point pét. à L3
                                    : (60 - 61 - 62
 Angle des nervures L3 L'3
                                    : (63) - 64 - 65 - 66 - 67
 Largeur du sinus pétiolaire
 Dent terminale du lobe latéral supérieur
 Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
 Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
 Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües
```

dantadantadantadahatad

Uninternal control

heures 94